

**CANTOR A-T-IL RAISON ?**  
**Réflexions sur la dénombrabilité des ensembles infinis.**  
**Par Jean Sousselier**

### 1. Retour sur la preuve de CANTOR.

Pour prouver que l'ensemble des réels de l'intervalle  $[0,1]$  n'est pas dénombrable, Cantor a mis en évidence l'incohérence induite par une bijection de cet ensemble avec l'ensemble  $\mathbb{N}$  des entiers naturels. En effet, si une telle bijection existait, on pourrait écrire :

$$[0,1] = \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$$

chaque réel  $X_i$  s'écrivant :

$$X_i = 0, a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \dots$$

Considérons alors le nombre réel  $Y$  dont la  $i$  ème décimale vaut 1 si la  $i$  ème décimale  $a_i$  de  $X_i$  est différente de 1, et 2 dans le cas contraire, et ceci pour toutes les valeurs de  $i$ , jusqu'à l'infini.

Le nombre réel  $Y$  ainsi créé est donc différent de  $X_i$  par sa  $i$  ème décimale, et ceci pour tout  $i$ . Il n'appartient donc pas à l'ensemble précédent  $\{X_1, X_2, X_3, \dots\}$ .

On arrive donc bien à une contradiction, et on en conclut que l'ensemble des réels n'est pas dénombrable : c'est ce raisonnement que nous appellerons par la suite "preuve de Cantor".

### 2. Application du même procédé aux nombres entiers.

On peut appliquer le même raisonnement avec les nombres entiers. On peut définir une bijection des entiers sur  $\mathbb{N}$  par extension, en procédant ainsi : on prend d'abord tous les nombres impairs, par ordre croissant :

$$X_1 = 1$$

$$X_2 = 3$$

$$X_3 = 5$$

.....

Considérons maintenant les nombres pairs, par exemple le nombre 2 : quel que soit  $n$ , on n'a jamais  $X_n = 2$  donc ce nombre n'appartient pas à notre liste en correspondance biunivoque avec  $\mathbb{N}$ .

### 3. Discussion.

De ce qui précède, on doit conclure que le raisonnement qui est à la base de la démonstration est faux, à savoir : "ayant supposé avoir classé (ou ordonné, ou numéroté) tous les éléments de mon ensemble, j'en trouve un qui en fait ne peut pas être classé, donc la bijection avec l'ensemble des entiers n'est pas établie, donc mon ensemble n'est pas dénombrable".

Il y a cependant une différence entre les exemples des paragraphes 1 et 2 : dans le cas des nombres réels, la démonstration s'applique à n'importe quelle bijection (numérotation), alors que dans le cas des nombres entiers, la démonstration s'applique à une numérotation bien choisie. Cela est vrai, mais n'empêche pas le défaut de cette démonstration, qui pour être valide devrait l'être dans tous les cas.

Autrement dit, la conclusion avec les nombres réels est : "quelle que soit la bijection avec  $\mathbb{N}$  que l'on imagine, on peut trouver des nombres n'appartenant pas à cette bijection". Avec les nombres entiers, la conclusion est : "il existe des bijections avec  $\mathbb{N}$  telles que certains nombres n'appartiennent pas à cette bijection".

Cette différence n'est pas suffisante pour remettre en cause la non-validité de la preuve de Cantor, mais cela apporte quand même un certain trouble.

**Cette non-validité tient peut-être à l'utilisation du mot "dénombrable" qui est choisi par Cantor, alors que le mot « énumérable » aurait été préférable.** En effet le mot « dénombrable », inclut la notion de nombre, qui n'a rien à faire ici, qui n'a aucune signification s'agissant d'un ensemble infini, et cet artifice sémantique est trompeur. Toutes les considérations subséquentes sur la cardinalité des ensembles infinis ne sont qu'une extension absolument injustifiée, donc fallacieuse, de la cardinalité des ensembles finis. Cet abus de vocabulaire n'autorise en rien à poser que le cardinal de tel ensemble infini est inférieur au cardinal de tel autre. Tout ce que prouve Cantor, c'est qu'il n'y a pas de bijection possible entre l'ensemble des réels et l'ensemble des entiers, point final. Quant à la dénombrabilité, elle ne peut avoir aucune définition, c'est un non-sens appliqué à l'infini.

On ne peut que souscrire à ce texte publié sur Wikipedia, à l'exception de la dernière phrase !

Jusqu'à Cantor, l'infini est l'infini potentiel, la possibilité de continuer un processus sans s'arrêter. La comparaison d'ensembles infinis suppose l'infini dit achevé, actuel ou encore complet : un ensemble infini vu comme une totalité, ce qu'ont refusé beaucoup de mathématiciens ([Gauss](#), ou à l'époque de Cantor, [Kronecker](#)). Pour ceux-ci le fait de considérer une infinité d'objets comme un tout, par exemple tous les entiers naturels, c'est-à-dire la notion même d'*ensemble* infini, n'a pas de sens. L'infini résulte seulement d'un procédé d'énumération sans répétitions qui ne s'interrompt pas. Seul l'infini dénombrable peut alors avoir à la rigueur un sens ; il est compris par le procédé qui l'engendre, plutôt que par la totalité de ses éléments. L'infini achevé sera encore contesté par [Henri Poincaré](#), contestation qui fonde également l'intuitionnisme de [Brouwer](#), celui-ci en donnant la forme la plus élaborée. Pour ce dernier seul l'infini dénombrable (en tant qu'infini potentiel) existe, « l'ensemble des réels entre 0 et 1 » n'a pas de sens, mais si ses conceptions sont cohérentes, elles induisent une profonde remise en cause des mathématiques. En distinguant le premier deux infinis distincts, et en en déduisant de façon simple un résultat mathématique déjà obtenu de façon différente par [Joseph Liouville](#), Cantor donne des arguments pour l'infini complet, qu'aujourd'hui ne songent même plus à discuter la très grande majorité des mathématiciens.

#### 4. Il ne faut pas traiter l'infini comme le fini.

L'argument de Cantor revient à étendre à « l'infini » la proposition « jusqu'à la ligne  $n$ , on a construit un nombre différent de ceux des  $n$  premières lignes » : Cette proposition étant vraie quel que soit  $n$ , elle est vraie à l'infini.

- Considérons la proposition suivante : soient les nombres  $y=1$  et  $x_n = 0,999999999$  (avec  $n$  chiffres 9).  
Quel que soit  $n$ , on a  $x_n$  strictement inférieur à  $y$ . Si on raisonne comme Cantor, **on aboutit à la conclusion que le nombre 0,9999... avec une infinité de 9 est strictement inférieur à 1 !** Cette conclusion devrait laisser perplexe.
- Autre argument : on sait que l'ensemble des parties de  $\mathbb{N}$  ayant au plus  $n$  éléments est dénombrable. Cela est vrai quel que soit  $n$ , donc c'est vrai à l'infini. Or, c'est manifestement faux, en tous cas absolument contradictoire avec la conclusion de Cantor !

On voit donc qu'étendre à l'infini une proposition vraie quel que soit  $n$  n'est pas toujours valide. Du reste, c'est bien ce qu'applique spontanément les mathématiciens quand ils disent que 2 parallèles ne se rencontrent jamais ....sauf à l'infini !

#### 5. Où Cantor est pris à son propre jeu

Montrons une autre faille du raisonnement de Cantor : prenons le nombre  $x$  trouvé par Cantor comme n'appartenant pas à notre bijection, et considérons le nouveau classement suivant : d'abord  $x$ , puis la bijection initiale. Nous avons créé ainsi une nouvelle bijection incluant le nombre qui était précédemment extérieur à notre bijection (cf Hilbert et son hôtel avec une infinité de chambres). Et on peut recommencer autant de fois que l'on voudra, chaque fois que Cantor construit un nombre ne figurant pas dans notre classement, nous constituons immédiatement un nouveau classement en le mettant en tête du classement précédent. Donc qui a raison à ce petit jeu-là ? Personne, car si Cantor affirme « Quelle que soit la bijection que vous ferez, je construirai un nombre qui lui sera extérieur », nous lui répondons : « Quel que soit le nombre que vous proposerez ainsi, nous établirons une nouvelle bijection qui l'intégrera ».

#### 6. Un exemple encore plus troublant.

Considérons l'ensemble  $A$  des vecteurs :  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  chaque  $a_i$  étant un entier  $\in \mathbb{N}$ , et  $n$  étant un entier quelconque. Le cardinal de cet ensemble  $A$  est donc de l'ordre de :  $\aleph_n$  en désignant par  $\aleph$  le cardinal de  $\mathbb{N}$ , il est supérieur au cardinal de l'ensemble des réels.

Or l'ensemble  $A$  est dénombrable, puisqu'il s'agit de l'ensemble des parties finies de  $\mathbb{N}$ .

#### 7. Quand on peut démontrer qu'il y a plus d'entiers que de nombres réels !

Beaucoup mieux qu'une simple bijection entre les réels et les entiers, démontrons qu'on peut établir une correspondance entre les réels et des sous-ensembles infinis d'entiers, chaque entier n'existant bien entendu que dans un seul sous-ensemble au plus.

Etablissons cette correspondance pour tous les réels compris entre 0,1 et 1, la généralisation à l'ensemble des réels ne posant pas de difficultés.

Considérons un tel nombre  $X$  réel, et sa représentation avec une « infinité » de chiffres :

$X = 0, x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \dots$  et soit  $A(X)$  l'ensemble infini d'entiers suivant :

$$A(X) = \{ x_1, x_1x_2, x_1x_2x_3, x_1x_2x_3x_4, x_1x_2x_3x_4x_5, \dots \}$$

Ces entiers sont bien entendu tous différents. Associons à  $X$  l'ensemble  $S(X)=A(X)$ .

Considérons un autre réel  $Y = 0, y_1 y_2 y_3 y_4 \dots$

Soit  $k$  le plus petit indice tel que  $x_k$  soit différent de  $y_k$  ( $k$  existe bien si  $Y$  est différent de  $X$ ).

Tous les entiers de l'ensemble  $A(Y)$  à partir de  $y_1y_2y_3\dots y_k$  sont différents de tous les entiers de l'ensemble  $A(X)$ , puisqu'ils diffèrent au moins par leur  $k$ ème chiffre. Associons donc à  $Y$  le sous-ensemble  $S(Y)$  de  $A(Y)$  :  $S(Y) = \{ y_1y_2y_3 \dots y_k, \dots \}$

On peut continuer indéfiniment : pour chaque nouveau réel  $U$ , on considère l'indice  $k$  défini ainsi : soit  $k(X)$  le plus petit indice tel que  $x_k$  soit différent de  $u_k$ , on prend pour  $k$  le plus grand des nombres  $k(X), k(Y), k(Z), \dots$ , et on associe à  $U$  le sous-ensemble  $S(U)$  comprenant tous les entiers de  $A(U)$  à partir de  $u_1u_2 \dots u_k$ .

**Quel que soit l'ensemble  $\{X, Y, Z, \dots, U, \dots\}$  de nombres réels, on peut ainsi faire correspondre à chaque  $U$  une infinité d'entiers  $S(U)$  qui ne sont présents dans aucun sous-ensemble précédent  $S(X), S(Y), \dots$ .**

**Il y a donc « beaucoup plus » d'entiers que de nombres réels. N'est-ce pas troublant ?**

**Remarque :** Il y a une faiblesse dans cette démonstration, qui est la suivante : quand on énumère les réels comme ci-dessus, pourquoi ne pas associer l'entier 1 au premier réel proposé, l'entier 2 au deuxième, etc. : on aurait alors établi d'une façon extrêmement triviale une bijection entre réels et entiers ! La faille de ce processus vient du fait qu'on ne sait pas énumérer les réels, il n'y a aucune méthode pour cela, comme on l'a déjà remarqué plus haut. Cela semble disqualifier notre raisonnement. Il n'en reste pas moins qu'à défaut d'épuiser l'ensemble des réels, ce que personne ne sait faire, on met en évidence que quel que soit l'ensemble de réels que l'on considère, (fini ou infini), on sait associer à chacun d'eux une infinité d'entiers, tous différents bien entendu. On aurait donc tendance à conclure que le cardinal des entiers est d'un ordre supérieur au cardinal des réels !

## 8. Conclusion.

Tout cela donne à penser que Kronecker et Poincaré avaient raison, contre Cantor.

### Remarque ajoutée en 2019.

La position d'Henri Poincaré est clairement exposée dans ses « Dernières Pensées », publiées à titre posthume.

Il distingue deux catégories de mathématiciens, les Pragmatistes et les Cantoriens. Ces derniers, à la différence des premiers, admettent l'existence de l'infini actuel (ce qui est au cœur du problème traité dans cette note). Alors que les pragmatistes (et il se considère comme tel) n'admettent que les objets qui peuvent être définis en un nombre fini de mots.

La preuve de Cantor repose sur un nombre  $Y$  qui ne rentre pas dans ce cadre, donc les pragmatistes la réfutent a priori.